

NUEVAS PAUTAS DE VACUNACIÓN ANTITETÁNICA EN PERSONAS ADULTAS

Personas adultas sin dosis previas

1^a dosis

Tan pronto como sea posible

2^a dosis

Al menos 1 mes después de la 1^a dosis

3^a dosis

Al menos 6 meses después de la 2^a dosis

(1^{er} recuerdo)
4^a dosis

10 años tras la 3^a dosis

(2^o recuerdo)
5^a dosis

10 años tras la 4^a dosis

Personas adultas mayores de 16 años vacunadas según el calendario de vacunación vigente (6 dosis)

1 dosis de recuerdo a los 65 años de edad

Personas adultas con vacunación incompleta (en la infancia o en la edad adulta)

Completar hasta 5 dosis

**NO REINICIAR VACUNACIÓN:
“DOSIS PUESTA,
DOSIS QUE CUENTA”**

PROFILAXIS EN HERIDAS

En caso de heridas tetanígenas e independientemente del estado de vacunación, se administrará una dosis de inmunoglobulina a las personas inmunodeprimidas o usuarias de drogas por vía parenteral.

Antecedentes de vacunación	Herida limpia		Herida tetanígena ¹	
	Vacuna (Td)	IGT ²	Vacuna (Td)	IGT ²
< 3 dosis o desconocida	SÍ (completar vacunación)	NO	SÍ (completar vacunación)	SÍ
3 ó 4 dosis	NO (administrar una dosis si hace más de 10 años desde la última dosis)	NO	NO (administrar una dosis si hace más de 5 años desde la última dosis)	NO ³
5 ó más dosis	NO	NO	NO (si hace más de 10 años de la última dosis, valorar administrar una única dosis adicional en función del tipo de herida)	NO ³

¹ Heridas tetanígenas: heridas o quemaduras con un importante grado de tejido desvitalizado, herida punzante (particularmente donde ha habido contacto con suelo o estiércol), las contaminadas con cuerpo extraño, fracturas con herida, mordeduras, congelación, aquellas que requieran intervención quirúrgica y que ésta se retrasa más de 6 horas, y aquellas que se presenten en pacientes que tienen sepsis sistémica.

² IGT: inmunoglobulina antitetánica. Se administrará en lugar separado de la vacuna. En general se administran 250 UI. Si han transcurrido más de 24 horas, en personas con más de 90 kg de peso, en heridas con alto riesgo de contaminación o en caso de quemaduras, fracturas o heridas infectadas, se administrará una dosis de 500 UI.

³ Las personas con heridas tetanígenas contaminadas con gran cantidad de material que puede contener esporas y/o que presente grandes zonas de tejido desvitalizado (heridas de alto riesgo), recibirán una dosis de inmunoglobulina.

HELDUENTZAKO TXERTAKETA ANTITETANIKOAREN JARRAIBIDE BERRIAK

Aurretiazko dosirik gabeko helduak

1. dosia

Ahalik eta lasterren

2. dosia

1. dositik hilabetera gutxienez

3. dosia

2. dositik 6 hilabetera gutxienez

(1. oroitzapena)
4. dosia

3. dositik 10 urtera

(2. oroitzapena)
5. dosia

4. dositik 10 urtera

16 urtetik gorakoak, indarrean dagoen haurren txertaketa egutegiaren arabera txertatu baziren (6 dosi)

Oroitzapen dosi bat
65 urterekin

Txertaketa ez-osoia izan duten helduak (haurtzaroan zein nagusiaroan)

5. dosiraino bete

EZ BERRABIARAZI TXERTAKETA:
"JARRITAKO DOSIA, BALIO DUEN DOSIA"

ZAURIETARAKO PROFILAXIA

Inmunodeprimituei eta bide parenteraleko droga-erabiltzaileei inmunoglobulina-dosi bat jarriko zaie, zauri tetanigenoak dituztenean eta txertaketa-egoera edozein delarik.

Txertaketaren aurrekariak	Zauri garbia		Zauri tetanigenoa ¹	
	Txertoa (Td)	IGT ²	Txertoa (Td)	IGT ²
< 3 dosi edo ezezaguna	BAI (txertaketa osatu)	EZ	BAI (txertaketa osatu)	BAI
3 edo 4 dosi	EZ (dosi bat jarri, azken dositik 10 urte baino gehiago iragan badira)	EZ	EZ (dosi bat jarri, azken dositik 5 urte baino gehiago iragan badira)	EZ ³
5 dosi edo gehiago	EZ	EZ	EZ (azken dositik 10 urte baino gehiago iragan badira, baloratu osagarrizko dosi bakarra jartzea ala ez, zauriaren arabera)	EZ ³

¹ Zauri tetanigenoak: desbitalizatutako ehun-gradu handia duten zauriak eta erredurak, zauri zorrotzak (bereziki lurzoruarekin edo simaurrarekin kontaktua izan denean), gorputz arraroekin kutsatutakoak, hausturak zauriekin, koskadak, izozketak, interbentzio kirurgikoa eskatu eta interbentzio horiek 6 orduetik gora atzeratzen direnean, eta sepsi sistemikoa duten pacienteak dituzten zauriak.

² IGT: inmunoglobulina antitetanikoa. Txertoa jartzen den lekuaren barik, beste leku batean jarriko da. Oro har, 250 UI ipintzen dira. 24 ordu baino gehiago iragan badira, 90 kg baino gehiago duten pertsonetan, kutsatzeko arrisku handiko zaurietan edo infektatutako erredura, haustura edo zauriak direnean, 500 UI-ko dosia jarriko da.

³ Arrisku handiko zauri tetanigenodun pertsonei inmunoglobulina dosi bat jarriko zaie; arrisku handiko zauri tetanigenotzat hartzen dira, bai esporak eduki ditzaketen material-kopuru handiarekin kutsatutako zauriak baita desbitalizatutako ehun-zona handiko zauriak ere.