

VIGILANCIA DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) **Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE)**

Temporada 2026-2027

(del 28 de septiembre de 2026 al 3 de octubre de 2027)

Semana 40 (del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026)


La tasa de COVID-19 mantiene una tendencia ascendente en Atención Primaria, pero desciende a nivel hospitalario esta semana. Las tasas de síndrome gripal y de bronquiolitis se mantienen en el nivel basal (inter epidémico).

- La tasa de IRA en la Red de Atención Primaria (AP) ha sido de 352,4 casos por 100.000 habitantes (368,2/100.000 en la semana anterior).
- Las tasas de COVID-19 y de bronquiolitis en AP ascienden esta semana, pero desciende la del síndrome gripal
- Se han confirmado el 74,1% de las 54 muestras vigía enviadas al laboratorio de microbiología, detectándose 11 SARS-CoV-2 y ningún virus de la gripe o VRS.
- La tasa de IRA grave en la red hospitalaria de Osakidetza ha sido de 12,9 casos por 100.000 habitantes (11,4/100.000 en la semana anterior).
- Las tasas bronquiolitis (<2 años) en AP y la del síndrome gripal en urgencias se mantienen en el nivel de intensidad basal (valor inter epidémico). La tasa de IRA en AP cruzó el umbral la semana pasada, situándose actualmente en un nivel de intensidad bajo.
- Esta semana se han registrado 279 SARS-CoV-2, 40 virus de la gripe y un VRS en el Sistema de Información Microbiológica de la CAE.


IRA en Atención Primaria

Vigilancia sindrómica


Mediante esta vigilancia se estima la tasa de casos de IRA en Atención Primaria a partir de la información recogida en Historia Clínica Electrónica y utilizando códigos CIE-10. La tasa de IRA esta semana ha sido de 352,4 casos por 100.000 habitantes (368,2/100.000 en la semana anterior). Por territorios históricos, las tasas han sido de 251,4/100.000 en Araba, 370,8/100.000 en Bizkaia y 370,2/100.000 en Gipuzkoa.



Por grupos de edad, la tasa más alta se ha registrado en el grupo de menores de 1 año con 3983,2 casos por 100.000 habitantes, seguido por los grupos de 1 a 4 y de mayores de 79 años con 1821,4 y 400,0 casos por 100.000, respectivamente.



La vigilancia de los Procesos Leves Autolimitados (PLA) relacionados con las IRA (*Resfriado común* y *Fiebre* con algún síntoma de IRA¹) tiene como objetivo ver la evolución de estos procesos que son atendidos por el personal de enfermería. Esta semana la tasa ha sido de 151,3 casos por 100.000 habitantes (156,0/100.000 en la semana anterior).



En cuanto a incidencia por Organización Sanitaria Integrada (OSI), esta semana las tasas ascienden en algunas OSI y descienden en otras.


Tasa y razón de tasas de IRA por OSI y semana epidemiológica.
Red de Atención Primaria. 2026-2027, CAE

OSI	Tasa Semana 40	Tasa Semana 39
OSI Araba	271,3	264,7
OSI Barakaldo-Sestao	334,6	373,8
OSI Barrualde-Galdakao	401,9	439,3
OSI Bidasoa	356,8	307,0
OSI Bilbao-Basurto	389,8	425,4
OSI Debarrena	396,3	380,2
OSI Debagoiena	323,1	317,8
OSI Donostialdea	351,2	360,8
OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces	371,0	402,4
OSI Goierri-Urola Garaia	409,3	448,6
OSI Rioja Alavesa	494,3	424,6
OSI Tolosaldea	349,6	389,1
OSI Uribe	291,0	285,0

¹ Para más información consultar [Metodología en vigilancia de IRA](#)

La tasa de síndrome gripal en AP desciende a los 4,0 casos por 100.000 habitantes (4,5 /100.000 la semana anterior). La tasa de bronquiolitis (en menores de dos años) aumenta hasta los 264,0 casos por 100.000 habitantes (191,2/100.000 en la semana anterior) y la de COVID-19 asciende a 20,3 casos por 100.000 habitantes (17,6/100.000 en la semana anterior).


**Tasa por temporada y semana epidemiológica.
Red de Atención Primaria. 2026-2027, CAE**



Diagnóstico microbiológico de muestras centinela

Esta vigilancia consiste en la selección sistemática de al menos cinco casos a la semana de pacientes pertenecientes a cupos centinela con síntomas de IRA, a los que se les toma una muestra para su diagnóstico microbiológico. Esta semana se han analizado en el laboratorio de microbiología referente de IRA 54 muestras centinela y se han confirmado el 74,1%. Se han registrado 11 SARS-CoV-2 y ningún virus de la gripe o VRS. También se han detectado 20 rinovirus, 5 coronavirus estacionales, 4 virus parainfluenzae y 3 enterovirus.

**Tasa de IRA en AP y núm. de detecciones de virus respiratorios en la red centinela,
por semana epidemiológica. 2026-2027, CAE**



Esta semana, la positividad de SARS-CoV-2 ha sido del 20,4% (31,7% la semana anterior), y la del virus de la gripe y VRS del 0,0% (3,2% y 0,0% la semana anterior, respectivamente).


Porcentaje de positividad entre muestras centinela enviadas al laboratorio de microbiología por virus respiratorio. Red centinela. 2026-2027, CAE

	Semana 40		Semana 39		Total 2026-2027	
	Detec.	Positiv (%)	Detec.	Positiv (%)	Detec.	Positiv. (%)
SARS-CoV-2	11	20,4	20	31,7	11	20,4
Influenza	0	0	2	3,2	0	0
VRS	0	0	0	0,0	0	0
Metaneumovirus	0	0	0	0,0	0	0
Parainfluenza	4	7,4	0	0,0	4	7,4
Adenovirus	0	0	1	1,6	0	0
Rinovirus	20	37	23	36,5	20	37
CoV estacionales	5	9,3	1	1,6	5	9,3
Enterovirus	3	5,6	4	6,3	3	5,6


IRA grave (IRAG) en la red hospitalaria de Osakidetza

Vigilancia sindrómica


Se consideran casos graves de IRA o IRAG (infección respiratoria aguda grave) aquellos que requieren ingreso en la red de hospitales de Osakidetza. Esta información se obtiene semanalmente de la Historia Clínica Electrónica utilizando códigos diagnósticos de la CIE-10. La tasa de IRAG ha sido de 12,9 casos por 100.000 habitantes (11,4/100.000 en la semana anterior).



Por grupos de edad, la tasa más alta se ha registrado en el grupo de mayores de 79 años con 74,5 casos por 100.000, seguido por el grupo menores de un año y el grupo de 70-79 años con 38,2 y 27,1 casos por 100.000, respectivamente.



La tasa de ingresos registrados con códigos diagnósticos de VRS (J12.1, J20.5 y J21.0) se ha mantenido en 0,0 casos por 100.000 habitantes. Los ingresos con códigos de gripe (J09-J11) han sido de 0,4 casos por 100.000 habitantes (0,1/100.000 en la semana anterior), mientras que los ingresos por COVID-19 (U07.1) se sitúan en 1,4 casos por 100.000 habitantes (1,8/100.000 la semana anterior).




Diagnóstico microbiológico de muestras de IRAG

En este apartado se muestran los resultados de los análisis virológicos realizados a los casos de IRAG en la red de hospitales de Osakidetza. La positividad del SARS-CoV-2 desciende hasta el 16,2% esta semana (21,7% en la semana anterior), la del virus de la gripe asciende al 4,9% (1,3% en la semana anterior) y la del VRS se sitúa en el 0,6% (0,0% en la semana anterior).

Muestras analizadas y positividad (%) de muestras de IRAG analizadas en los laboratorios de microbiología. Red hospitalaria de Osakidetza. 2026-2027, CAE

	Semana 40		Semana 39		Total 2026-2027	
	Nº de muestras	Positividad (%)	Nº de muestras	Positividad (%)	Nº de muestras	Positividad (%)
SARS-CoV-2	234	16,2	189	21,7	234	16,2
Influenza	206	4,9	158	1,3	206	4,9
VRS	176	0,6	145	0,0	176	0,6

Porcentaje de positividad de muestras de IRAG analizadas en los laboratorios de microbiología por virus respiratorio y semana epidemiológica. Red hospitalaria de Osakidetza. 2026-2027, CAE




Umbrales epidémicos y niveles de intensidad

Se implementa el Método de Epidemias Móviles (MEM) en la vigilancia de infecciones respiratorias agudas (IRAs) en Euskadi para la estimación de umbrales epidémicos y niveles de intensidad, que permite identificar de forma objetiva el inicio y el fin de las epidemias estacionales y clasificar su intensidad.


En el caso de la vigilancia de IRA de atención primaria, el umbral epidémico se superó en la semana 39/2026, situándose actualmente en un nivel de intensidad bajo.

**Intensidad de la epidemia de IRAs comparada con la serie histórica.
Red de Atención Primaria. 2026-2027, CAE**




En el síndrome gripal, los datos extraídos de las urgencias hospitalarias indican que la tasa se mantiene en un nivel de intensidad basal (inter epidémico).

**Intensidad de la epidemia de gripe en urgencias comparada con la serie histórica.
Red hospitalaria de Osakidetza. 2026-2027, CAE**



Finalmente, en lo que se refiere a los diagnósticos de bronquiolitis de atención primaria en menores de 2 años, la tasa se mantiene en un nivel de intensidad basal (inter epidémico), pero con clara tendencia ascendente.

Intensidad de la epidemia de bronquiolitis (<2 años) comparada con la serie histórica. Red de Atención Primaria. 2026-2027, CAE




Intensidad comparada con serie histórica: ■ Situación basal ■ Baja ■ Media ■ Alta ■ Muy alta

Detecciones de virus respiratorios en el SIM

Se registran las muestras positivas a SARS-CoV-2, virus de la gripe y VRS notificadas por los servicios de microbiología de la Red de Diagnóstico Biológico de Osakidetza. Esta semana se han detectado 279 SARS-CoV-2, 40 virus de la gripe y un VRS en este sistema.

De los 40 virus gripales detectados esta semana, 14 han sido tipo A, 14 A(H3), 8 A(H1)pdm09 y 4 tipo B. Desde la semana 40/2026 se han registrado 40 detecciones de virus de la gripe, 36 (90,0%) de tipo A y 4 (10,0%) de tipo B. De los 22 virus tipo A subtipados, 14 (63,6%) han sido A(H3) y 8 (36,4%) A(H1)pdm09.

Nº de detecciones semanales de SARS-CoV-2, influenza y VRS. SIM. 2026-2027, CAE



Más información sobre la metodología y otros aspectos en la [*web del Departamento de Salud*](#) y en los siguientes enlaces: [*SiVIRA*](#) (estatal), [*Flu News*](#) (Europa, gripe), [*FluNet*](#), (Mundial, gripe), [*OPS*](#) (América, gripe), [*CDC*](#) (EEUU).

7 de octubre de 2026

Vigilancia Epidemiológica
Dirección de Salud Pública y Adicciones